

## Soins naturels des fruitiers

**Mars 2025**

Petit à petit, les journées s'allongent, les températures remontent, les bourgeons gonflent et s'ouvrent...


Serait-ce le printemps qui approche ?

En ce temps de carême, il est temps pour le jardinier de commencer certains traitements préventifs des maladies, de finir la pose des nichoirs et... d'ouvrir l'œil à l'éveil de la végétation !



### Sensibilité des fruitiers aux maladies :

Dès ouverture des premières feuilles, les arbres fruitiers sont sensibles à diverses maladies, en lien avec des conditions de températures et d'humidité notamment favorables aux champignons.



Conditions nécessaires aux contaminations par la tavelure (d'après les tables de Mills et Laplace)

Température moyenne (°C)	7	8	10	11	12	13	15	18
Période d'humectation pour un risque moyen de contamination (en heure)	18	17	14	13	12	11	9	8

- Fruits à pépins : pour la gestion de la tavelure, AVANT chaque pluie dès stade "oreilles de souris" (photo ci-contre), si la règle des 3 x 10 est prévue (10 mm de pluie, pendant 10h, à T°C > ou = 10°C), ou si les conditions de feuillage humide sont réunies (tableau ci-contre), réaliser un traitement fongicide (qui fait le "vide") ou pour les plus aventureux... un traitement à base d'extrait fermenté (qui fait le "plein") ;

### Recettes des traitements anti fongiques :

Fongicide (action sur 3 semaines, jusqu'à 20mm de pluie) :

Bouillie bordelaise (10g) + Décoction de prêle (100mL) + Teinture mère de propolis (1mL) + 1L eau de pluie

**OU**

Extraits fermentés (action sur 1 à 2 semaines) :

Petit-lait ou LiFoFer (50mL) + 1L eau de pluie



- Fruits à noyaux : traitement pour la gestion de la cloque du pêcher, et pour la gestion du monilia des fleurs sur cerisier et abricotier systématiquement au stade gonflement des bourgeons à feuilles ;
- Oliviers : début de sensibilité à la cercosporiose et à l'œil de paon, un premier traitement ce mois-ci sera le bienvenu dès que T°C > 12°C en conditions humides.



**Attention !** le pêcher et certaines variétés de poires étant phytosensibles au cuivre, il est conseillé de ne pas utiliser de Bouillie bordelaise sur ces essences une fois le feuillage ouvert.



### Traitements anti pucerons :

Certains fruitiers sont très sensibles aux pucerons, parmi lesquels les fruitiers à pépins, et les pruniers. Il est ainsi conseillé de réaliser une huile en début mars en pulvérisation sur les rameaux encore à nu, afin d'asphyxier les œufs voire de limiter l'installation des fondatrices.

Par la suite, si des pucerons se développent sur les premières feuilles, un traitement à base de savon noir, voire d'huiles essentielles, peut être réalisé. Plus tôt les pucerons sont gérés, moins vous aurez de soucis sur le reste de la saison !



Petit conseil : l'huile mettant quelques jours à agir, regardez la météo pour pulvériser sur un créneau de 2-3 jours sans pluie.

**Attention !** Les produits de "traitement hivernal" généralement trouvés dans le commerce sont à base d'huile de paraffine, dérivé du pétrole, tout aussi efficace mais moins "naturels" pour vos fruitiers...

#### Recettes de traitement hivernal (sur bois) :

60mL Huile de colza + 40mL Savon noir  
+ 1L eau de pluie  
(+ 100g d'argile si pulvérisateur thermique ou électrique)

#### Recettes de traitement de saison (sur feuilles) :

Savon noir (50mL) **OU** si forte infestation  
Savon noir (50mL) + Huile essentielle de menthe poivrée (10 gouttes) + citronnelle (10 gouttes) + 1L eau de pluie

### Petit point de culture générale... les oiseaux insectivores

Des questions ?  
Contactez-nous !  
contact@labora.fr

Jusqu'à 10 niochirs / ha peuvent être installés dans votre verger, sachant qu'un couple peut consommer jusqu'à...  
18 000 insectes par ponte... à vos niochirs !

